

**PENERAPAN TERAPI MUSIK TERHADAP KLIEN
SKIZOFRENIA PARANOID PADA HALUSINASI
PENDENGARAN DI RUANG NAKULA
RSJD dr. Arif Zainuddin Surakarta**

**KARYA ILMIAH AKHIR NERS
Disusun Untuk Memperoleh Gelar Ners
Pada Program Studi Ners
Universitas ‘Aisyiyah Surakarta**



**RESTI PRATIWI
202214112**

**PROGRAM STUDI NERS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ‘AISYIYAH SURAKARTA
2022/2023**

**PENERAPAN TERAPI MUSIK TERHADAP KLIEN
SKIZOFRENIA PARANOID PADA HALUSINASI
PENDENGARAN DI RSJD
dr. Arif Zainuddin Surakarta**

Resti Pratiwi¹, Norman Wijaya Gati², Suyatno³

rpratiwi209@gmail.com

Universitas 'Aisyiyah Surakarta

ABSTRAK

Latar Belakang : Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada tahun 2019 terdapat 26.842 orang mengalami gangguan Skizofrenia, 67.057 orang yang mengalami depresi dan 67.057 orang mengalami gangguan mental emosional. Berdasarkan data yang diperoleh dari RS Jiwa Daerah Surakarta pada bulan Desember 2020 bahwa prevalensi pasien yang dirawat ada 5.669 klien rawat inap salah satu masalah dari gangguan jiwa yang menjadi penyebab terbesar di bawa ke rumah sakit adalah halusinasi dengan data 3.654 klien. **Tujuan** : Mengetahui hasil penerapan terapi musik terhadap klien skizofrenia paranoid pada halusinasi pendengaran. **Metode** : Penelitian penerapan deskriptif dengan menggunakan rancangan studi kasus dengan 2 random sampling dan menggunakan lembar kuesioner AHRS (*Auditory Hallucination Rating Scale*). **Hasil** : Hasil penerapan terapi mendengarkan musik terhadap tingkat halusinasi. Pada responden I mengalami penurunan dari skor 17 menjadi 11 sedangkan responden II mengalami penurunan dari 15 menjadi 9. **Kesimpulan** : Terapi mendengarkan musik dapat menurunkan tingkat halusinasi pada pasien halusinasi di RSJD dr Arif Zainudin Surakarta.

Kata Kunci : Terapi musik, tingkat halusinasi

**APPLICATION OF MUSIC THERAPY TO PARANOID
SCHIZOPHRENIC CLIENTS IN HISTORICAL
HALUCINATIONS IN RSJD**

dr. Arif Zainuddin Surakarta

Resti Pratiwi¹, Norman Wijaya Gati², Suyatno³

rpratiwi209@gmail.com

University Of ' Aisyiyah Surakarta

ABSTRACT

Background : Based on data from the Central Java Health Service in 2019 there were 26,842 people experiencing schizophrenia, 67,057 people experiencing depression and 67,057 people experiencing emotional mental disorders. Based on data obtained from the Surakarta Regional Mental Hospital in December 2020, the prevalence of patients treated was 5,669 inpatient clients. One of the problems of mental disorders that was the biggest cause of being brought to the hospital was hallucinations with data on 3,654 clients. **Objective** : Knowing the results of the application of music therapy to clients with paranoid schizophrenia in auditory hallucinations. **Methods** : Descriptive application research using a case study design with 2 random sampling and using the AHRS (Auditory Hallucination Rating Scale) questionnaire sheet. **Results** : The results of the application of music listening therapy to the level of hallucinations. In respondent I, the score decreased from 17 to 11, while in respondent II, it decreased from 15 to 9. **Conclusion** : Music listening therapy can reduce the level of hallucinations in hallucinatory patients at RSJD dr Arif Zainudin Surakarta.

Keywords: *music therapy, level of hallucinations*