

**PENGARUH TERAPI ZIKIR TERHADAP PENURUNAN
TANDA DAN GEJALA HALUSINASI PADA PASIEN
HALUSINASI DI RUANG SRIKANDI RSJD Dr. ARIF
ZAINUDIN SURAKARTA**

KARYA ILMIAH AKHIR NERS

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar
Ners Pada Program Studi Ners
Universitas 'Aisyiyah Surakarta**



MIKI LESTARI
(202214089)

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH SURAKARTA
2023**

**PENGARUH TERAPI ZIKIR TERHADAP PENURUNAN TANDA
DAN GEJALA HALUSINASI PADA PASIEN HALUSINASI DI
RUANG SRIKANDI RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN SURAKARTA**

Miki Lestari¹, Norman Wijaya Gati², Luluk Purnomo³
mikilestari96@gmail.com

Universitas 'Aisyiyah Surakarta

ABSTRAK

Latar belakang :Prevalensi peningkatan pasien skizofrenia sebanyak 7% dari penduduk Indonesia dan sekitar 70% pasien skizofrenia mengalami halusinasi. halusinasi merupakan persepsi palsu, klien dengan halusinasi sering merasakan keadaan yang hanya dapat dirasakan olehnya namun tidak dapat dirasakan oleh orang lain. dalam memperkecil dampak yang ditimbulkan halusinasi dibutuhkan penanganan yang tepat salah satunya dengan terapi dzikir, dimana terapi dzikir dapat menghilangkan rasa resah, gelisah dan hati menjadi tenang. **Tujuan :** Mengetahui hasil implementasi terapi dzikir pada pasien yang mengalami tanda dan gejala halusinasi di Rsjd Dr. Arif Zainudin Surakarta. **Metode :** Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif dalam bentuk *case study* (studi kasus) dengan memberikan lembar observasi AHRS. **Hasil :** Tingkat halusinasi sebelum dilakukan terapi dzikir pasien berada dalam kategori tanda dan gejala halusinasi berat. setelah dilakukan terapi dzikir pasien mengalami halusinasi ringan. terdapat perbedaan perkembangan tanda dan gejala halusinasi sebelum dan sesudah dilakukan penerapan terapi dzikir. **Kesimpulan :** Terdapat perbandingan perkembangan antara pasien yang mengalami tanda dan gejala halusinasi sebelum dan sesudah diberikan terapi dzikir.

Kata Kunci : Terapi dzikir, Tanda dan Gejala Halusinasi , Skizofrenia

**THE INFLUENCE OF ZIKIR THERAPY ON REDUCING SIGNS
AND SYMPTOMS OF HALUCINATIONS IN HALLUCINATION
PATIENTS IN THE SRIKANDI ROOM RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
SURAKARTA**

Miki Lestari¹, Norman Wijaya Gati², Luluk Purnomo³

mikilestari96@gmail.com

University of 'Aisyiyah Surakarta

ABSTRACT

Background : The increasing prevalence of schizophrenic patients is as much as 7% of the Indonesian population and around 70% of schizophrenic patients experience hallucinations. hallucinations are false perceptions, clients with hallucinations often feel a state that can only be felt by them but cannot be felt by other people. in minimizing the impact caused by hallucinations, proper treatment is needed, one of which is dhikr therapy, where dhikr therapy can relieve anxiety, anxiety and calm the heart. Arif Zainudin Surakarta. **Methods:** The research design used in this research is a descriptive research design in the form of a case study by providing AHRs observation sheets. **Results:** The level of hallucinations before the dhikr therapy was carried out, the patient was in the category of signs and symptoms of severe hallucinations. after dhikr therapy the patient experienced mild hallucinations. there are differences in the development of signs and symptoms of hallucinations before and after the application of dhikr therapy. **Conclusion:** There is a comparison of development between patients who experience signs and symptoms of hallucinations before and after being given dhikr therapy.

Keywords: Dhikr therapy, Signs and Symptoms of Hallucinations, Schizophrenia